


Méthotrexate Sous-Cutané

Seringue préremplie 50mg/ml

Lisez attentivement ces instructions et suivez toujours la technique d'injection recommandée.



PRÉPARATION

Choisissez une surface de travail propre, plane et bien éclairée.

Avant de commencer, réunir le matériel suivant:

1. Compresse stérile
2. Tampon d'alcool ou lingette désinfectante
3. Conteneur pour déchets à risques infectieux perforants
4. Méthotrexate Sous-Cutané en seringue préremplie

Lavez bien vos mains à l'eau et au savon. Examinez la seringue préremplie pour vérifier qu'elle n'est pas défectueuse ou endommagée.

CHOIX DU SITE D'INJECTION

Les meilleurs sites d'injection sont les suivants:

- le haut des cuisses et l'abdomen (sauf autour du nombril)
- Choisissez un point d'injection différent à chaque piqûre. Ceci peut réduire le risque d'irriter la peau au point d'injection.

L'image illustre les meilleurs sites d'injection.

MANIPULATION SÉCURITAIRE

Dans le cadre d'une bonne pratique médicale, les personnes qui manipulent souvent ce médicament doivent observer les consignes suivantes.

Méthotrexate Sous-Cutané en seringue préremplie ne doit pas entrer en contact avec la peau ou les muqueuses. Le méthotrexate ne doit pas entrer en contact avec la peau ni être inhalé sous forme de particules aéroportées. En cas de contamination, rincez abondamment à l'eau la zone touchée. Si vous ou une personne près de vous êtes blessé par l'aiguille, communiquez immédiatement avec un médecin et n'utilisez pas la seringue préremplie.

SIGNALEMENT D'EFFETS SECONDAIRES À SANTÉ CANADA

Vous pouvez signaler comme suit tout effet secondaire soupçonné qui est associé à l'utilisation de ce médicament : en ligne, par courriel ou par télécopie, en consultant la page Signaler un effet secondaire de Santé Canada (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) ou bien en composant sans frais le 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez un professionnel de la santé sur la prise en charge d'effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne fournit pas de conseils médicaux.

Vous pouvez aussi signaler des effets secondaires à Accord Healthcare Inc. en composant le 1-866-296-0354 ou en écrivant à safety@accordhealth.ca.

DESCRIPTION:

Méthotrexate Sous-Cutané 50mg/ml
Méthotrexate Sous-Cutané 50mg/ml
Méthotrexate Sous-Cutané 50mg/ml
Méthotrexate Sous-Cutané 50mg/ml
Méthotrexate Sous-Cutané 50mg/ml

CONCENTRATION: DOSE - UNE PAR SEMAINE:

15mg/0,30mL seringue préremplie à usage unique
17.5mg/0,35mL seringue préremplie à usage unique
20mg/0,4mL seringue préremplie à usage unique
22.5mg/0,45mL seringue préremplie à usage unique
25mg/0,5mL seringue préremplie à usage unique

CUP:

627968511104
627968511135
627968511166
627968511197
627968511227

DIN:

02491311
02491338
02491346
02491354
02491362

Instructions d'injection




1. DÉBALLER ET INSPECTER

- Retirez la seringue préremplie de méthotrexate de son emballage à la température ambiante.
- Examinez la seringue pour vérifier qu'elle n'est pas défectueuse ou endommagée.



2. DÉSINFECTER LE POINT D'INJECTION

- Choisissez un point d'injection et nettoyez-le au moyen d'une lingette ou d'un tampon désinfectants. Attendez au moins 60 secondes que le désinfectant sèche.



3. RETIRER LE CAPUCHON DE LA SERINGUE

- Tenez d'une main la gaine de protection en pointant l'aiguille vers l'avant et en veillant à ne pas toucher le piston.
- De l'autre main, retirez le capuchon en tirant vers l'avant.
- Jetez le capuchon dans un conteneur pour déchets à risques infectieux perforants.



4. ENFONCER L'AIGUILLE

- Pincez légèrement d'une main le site d'injection.
- De l'autre main et sans toucher la tête du piston, enfoncez l'aiguille dans le point d'injection à un angle de 90 degrés.



5. INJECTER LA SOLUTION

- Placez le pouce sur la tête du piston.
- Enfoncez lentement le piston en appuyant fermement jusqu'au bout pour vider complètement la seringue.
- Tenez fermement la peau jusqu'à ce que vous ayez terminé l'injection.



6. PROTÉGER L'AIGUILLE

- Le dispositif de protection de l'aiguille s'activera une fois le piston complètement enfoncé.
 - Sans bouger la seringue, retirez lentement votre pouce de la tête du piston.
 - Le piston s'élèvera sous votre pouce et un ressort rétractera l'aiguille dans la gaine de protection.



7. DISPOSER DU MATÉRIEL UTILISÉ

- Une fois que la seringue a servi, jetez immédiatement la gaine de protection de l'aiguille dans un conteneur pour déchets à risques infectieux perforants.
- Ne remettez pas le capuchon sur l'aiguille.
- Ne jetez pas la seringue dans les ordures ménagères.

accord

Accord Healthcare Inc.
3535 boul. Saint-Charles, Suite 704
Kirkland (Québec) H9H 5B9